

a¹ & Shunsuke Kitajima^{1,2}

Fig4. (A) Histogram indicating fold change of CC chemokine mRNA by RT-PCR in MCF7 cells based on DNA intensity. (B) Western blot of gR14-CR of the CCL2 gene in R6-positive breast cancer cell lines (1), transfected with the indicated shRNA #1 and #2, indicated by (C) RT-PCR of the CCL2 gene in patient-derived primary breast cancer cells transfected with the indicated shRNA. (D) ELISA of CCL2 levels in MCF7 cells transfected with the indicated shRNA. (E) Western blot of 48-hour culture. (F) gR14-CR of the indicated gene in MCF7 cells transfected with the indicated vector, LacZ, ZFP, RFP, or



Pha

○河野 晋¹, Paing Linn¹, 曾我 朋義², 高橋 智聡¹

¹金沢大学 がん進展制御研究所 腫瘍分子生物学分野, ²慶應義塾大学 先端生命科学研究所

A15

[illegible]

理子HIN

優秀賞

表彰狀

河野 晋 殿

貴殿は第三回さんと代謝研究会
若手の会において優秀な発表を
行いました
その栄誉を称えこれを表彰いた
します

令和元年十一月十四日

第三回 がんと代謝研究会 若手の会
実行委員長 日野 信次郎